

Auto-évaluation de la biosécurité pour la volaille – adapté du manuel d’instruction pour la biosécurité des fermes avicoles

Pratiques de biosécurité	Auto-évaluation				Remarques
	Toujours / souvent	Parfois	Jamais	S.O.	
Les oiseaux proviennent d'un couvoir visé par un programme de surveillance des maladies.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les oiseaux proviennent des troupeaux dont l'état de santé est connu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les dossiers de santé du troupeau d'origine sont disponibles (p. ex. les registres de vaccination, maladie et d'inspection vétérinaire).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dans les élevages où la planification « en tout plein/en tout vide » ne s'applique pas, il existe une aire de quarantaine désignée éloignée du troupeau, p. ex. troupeaux non commerciaux.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les oiseaux de différents âges (>7 jours de différence) sont logés dans de granges ou d'enclos séparés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les registres de déplacements (p. ex. l'arrivée de nouveaux oiseaux, l'expédition à l'abattoir, l'introduction ou l'enlèvement des oiseaux) sont tenus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Une période de vide sanitaire de 14 jours est respectée lorsque le troupeau est enlevé et avant que le prochain troupeau y soit placé.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Le nettoyage et la désinfection complète (p. ex. nettoyés par voie sèche, puis lavés à la pression et désinfectés) du poulailler sont accomplis au moins une fois par année.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La santé et la productivité du troupeau sont surveillées au moins une fois par jour.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les registres complets de la santé du troupeau sont tenus (p. ex. mortalités, oiseaux réformés, vaccination, médicaments, taux de consommation d'aliments et d'eau).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il existe des relations établies avec un vétérinaire ou une clinique vétérinaire.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Pratiques de biosécurité	Auto-évaluation				Remarques
	Toujours / souvent	Parfois	Jamais	S.O.	
Les oiseaux morts sont ramassés et enlevés de la zone de production quotidiennement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Seulement le fumier produit sur la ferme est utilisé sur la ferme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Le fumier est composté ou traité avant d'être sorti de l'exploitation OU épandu dans les champs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L'équipement qui est transporté dans un poulailler est doit être nettoyé et désinfecté au préalable ou l'équipement qui sert à la production n'est utilisé que dans un poulailler (p. ex. dispositifs de capture, corrals).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les systèmes de distribution de l'eau sont gardés propres en procédant à une purge, au détartrage et à la désinfection des conduites et des abreuvoirs sur une base régulière.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Si les abreuvoirs ouverts sont employés, ils sont nettoyés régulièrement afin d'éviter la contamination par la litière ou les aliments.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les aliments finis sont achetés auprès d'une source qui emploie des pratiques de biosécurité vérifiables (p. ex. HACCP).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les aliments sont inspectés régulièrement pour déterminer la présence d'humidité ou d'organismes nuisibles ou vérifier s'il y a débordement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La litière achetée est inspectée pour déterminer la présence d'humidité, d'organismes nuisibles ou e moisissures.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il existe une zone de 1 m de largeur de gravier ou de végétation de très petite taille exempte de débris autour de chaque poulailler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Les appâts et les pièges sont placés le long des murs, près des points d'entrée dans le périmètre du poulailler et à l'intérieur de la zone de service ainsi qu'à tout autre point d'entrée possible.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Pratiques de biosécurité	Auto-évaluation				Remarques
	Toujours / souvent	Parfois	Jamais	S.O.	
Les appâts sont surveillés régulièrement et sont renouvelés ou remplacés au besoin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Le personnel est informé à propos des zones établies, l'importance de ces zones et les protocoles de biosécurité de la ferme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Le personnel reçoit de la formation pour la gestion des oiseaux morts y compris la collecte, l'entreposage et l'élimination.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Remarque : La liste de contrôle ci-dessus ne compte pas tous les aspects à considérer lorsque vous élaborer un plan de biosécurité pour la ferme. Consultez votre Norme nationale de biosécurité à la ferme et le Guide de planification pour les éléments supplémentaires à examiner.